

Bemerkungen und Berichtigungen zum Catal. Coleopt. Europ. Cauc. et Arm. ross. 1906.

Von Prof. Dr. L. von Heyden in Bockenheim.

Zu Teilen des Katalogs, die nicht von mir bearbeitet sind, habe ich folgendes zu bemerken:

- p. 16. *Carabus Zwickii* non *Zwicki*, nach Lebrecht Zwicki benannt.
- » 17. *Carabus Fumini* non *Fumini*, nach M. Famin benannt.
- » 21. *Carabus nigropomeranus* streichen = Mischart.
- » 29. *Nebria Fauvelremi* in einem Wort.
Alpaeus Marschalli non *Marshalli* nach von Marschall zu Bieberstein, geboren am 11. August 1766 zu Aarberg-Bern, gestorben 5. Oktober 1826 zu Merosa bei Charkow.
- » 32. *Elaphrus latipennis* Sem. Kolgajev non Kolgajev.
- » 40. *Peryplus megaspilum* Walker non Walber.
- » 72. *Anisodactylus Cronzeli* Puel = *uemoriragus* var. *atricornis* Steph.
Zabrus nereensis non *nereusis* vom Pic de Nère, Pyren.
73. *Zabrus humeralis* Uhagon = *flavungulus* Chevz.
83. ad *Pocillus* v. *lossinianus* adde *luctuosus* Desbr. Frel. 1906, 91 (Orig. in Coll. Heyden).
Pocillus lepidus a. *viridis* non *viridanus* Preller = *eupreus* a. *beryllinus* Preller.
Pocillus lepidus a. *sibiricus* Prell. = *cyaneus* Letzner Z. Breslau 1852, 192.
85. *Parapedius gratus* Chd. = *coarctatus* Luc. A. Sc. Nat. 1842, 64.
86. *Onaseus Boeri* ist zusammengeleimtes Artefakt, vide Horae 1893, 468.
89. *Styracoderus*. = Patria ist von *abramcularius* — Alpujarras, Azarai — Sierra Gredos, *Martinezi* — Sierra Morena.
101. *Masoreus Wetterhali* non *Wetterhali*.
103. ad *Liouychus quadrillum* a. *unicolor* Heyd. Kf. Nass. II. 1904, 49.
104. *Melabletus myrmidon* A' non A.
105. *Dromiobus rectensis* Rye = *insignis* Luc. vide Fauvel R. 1905, 191.
121. *Rhantus Grapei* non *Grapei* nach dem Schweden Grape benannt.

- p. 155. *Medon Pythionissa* streichen. Jerusalem.
- » 160. *Leptacinus batychevus* non *batychevus*.
- » 168. *Physctops tataricus* Pall. It. App. 1773, 30, non App. 74.
- » 208. vor *Lomechusa*: *Apteranillus* (Fairm.) *Dohrui* Fairm. A. 1860, 150. Gibraltar.
- » 215. *Piochardia* zufügen zu *Oxysoma*: non Gervais 1849. *Arachnidæ*.
- » 273. *Ochthebius torrentium* non *torrentium*.
- » 316. *Neutosoma*. Die Untergattung muß heißen: *Moucsoma* Leveillé A'. 1894, 144.
Sturmia Ragusa Sic. 1892, 194, non Robineau-Desvoidy Diptera 1890.
Sturmiosoma Ragusa Sic. 1895.
346. *Melanophthalmu* v. *ovalipeennis* Reitt. Engadin, unie. von mir gefunden (coll. Ritter).
- » 354. *Anommatus Rosellæ* Rag. = *Agleus brunneus*!
- » 359. Bei *Hippodamia 7-maculata* sind nachzutragen die Aberrationen, die beschrieben sind in »Entom. Nachr.« von Meier 1897, 317; 1899, 100; Wimmel 1897, 163; Schulz 1899, 223.
- » 361. Bei *Adalia bipunctata* beifügen:
a. *concolor* Wim. Verh. Hamb. 1894, 11.
a. *perplexa* Meier, Ent. Nachr. 1899, 100.
a. *lineata* Meier, Ent. Nachr. 1899, 100.
a. *interrupta* Meier, Ent. Nachr. 1899, 101.
a. *polyguttata* Meier, Ent. Nachr. 1899, 101.
a. *Dönnlingi* Meier, Ent. Nachr. 1899, 101.
- » 366. *Propylaca 14-punctata* beifügen:
die von Sajo beschriebenen ab. Ent. Nachr. 1881, 273.
die von Walter beschriebenen ab. ebenda 1882, 20.
- » 369. Zu *Nephus Kiesewetteri*:
a. *Reyi* Sicard, Misc. ent. 1893, Nr. 20.
a. *undulatus* Sicard, Misc. ent. 1893, Nr. 20.
a. *tigrinus* Sicard, Misc. ent. 1893, Nr. 20.
- » 387. *Dina Assoi* Perez = *dina* Schf.
- » 389. Zu *Campylomorpha homalisinus*:
v. *sutura nigra* Chevr. Rev. zool. 1840, 50.
- » 391. Bei *Silesis* streichen:
dimidiatipennis Rehe. Algier.
jureucus Buys. Syria.

concolor Desbr. Syr. non T.

omissus (*Oertzeni*) ist Art.

- p. 391. *Agriontes* v. *scutellatus* Schf. i. l. = v. *parallelus* Schwz.
- » 410. *Buprestis Ledereri* non *Lederi*.
Buprestis Salomonis (*Nicolskiji*) adde 682.
- » 422. *Synoxyton serdentatum* Oliv. 1790.
Synoxyton chalcographum Panz. 1794.
- » 444. *Anthicus maltae* et *malrae* Rey non Pie.
- p. 451. *Hapalus Caruanoi* non *Caruanae*.
- » 453. Vor *Rhipiphorus*:
Rhixostylops Silvestri.
inquirendus Silv. Redia 1905, 315, R. Col. If.
1907, 24, Umbria.
Macrosiagonini loco *Rhipiphorini*.
Rhipiphorus subdipterus v. *pallescens* Sols. Trudy 1881, 57.
subdipterus v. *Antoniae* Pic (non Reitt).
subdipterus v. *Clermonti* Chob. A'. 1906, 224.
subdipterus v. *caucasicus* Reitt. emend.
Macrosiagon ist neutrum, also *meridionale*, *bipunctatum* etc.
- » 465. *Podonta conreicollis* Küst. = *morio* Kiesw. ex orig. coll. Heyden. — *morio* 1873, *conreicollis* 1850.
- » 474. *Asida Reitteri* adde 248.
conreicollis All. non Leconte.
- » 480. *Trigonoscelis contraria* Desbr. (*corallifera* Reitt.) streichen, Turemn. non Russ. m.
- » 487. Gattung *Hadrus* ist den Atlantiden eigentümlich, nicht Creta.
- » 488. *Opatrum Grenicri* ad *sculpturatum*.
- » 491. *Eledona agaricola* loco *agricola*.
- » 491. Die Art hat den Namen *Alphitophagus quadripustulatus* Steph. zu führen. Says Art *bifuscatus* America zweifelhaft.
- » 494. *Cossyphus* adde post *Dejeani*: *rugulosus* Peyron, Rev. zool. 1854, 224, Cri.
- » 497. *Pelorinus* non *Pelorimus*.
- » 498. Post *Odocnemis congener* adde: *tenebrioides* Germ. Mag. 1813, 123, Lu.
- » 500. *Adelphinus* v. *fulripennis* adde 242.
- » 502. *Vesperus hispalensis* Fuente = *conicollis* Fairm.
- » 504. *Erodinus reticulatus* F. Das richtige Citat ist Sys. Eleuth. II, 1801, 365. — *clathratus* von 1792.

- p. 512. *Penichroa* 1839 non 1831. — *Exilia* Muls. 1863.
Arinopalpis 1842, *Arinopalpus* 1845.
- » 524. *Dorcadiou streparius* loco *stepparius*.
- » 535. *Plateumaris abdominalis* Bedel = *affinis* Kunze: *pallipes* Kunze var. est.
- » 536. *Crioceris 12-punctata* adde: a. *6-punctata* Fröhlich Käf. Aschaff. 1887, 137. Bavar.
- » 539. *Gymnandrophthalma tibialis* Brullé adde: a. *Kraatzii* Clavar. Gen. Ins. Wytsm. 1906, 44, Gr.: *gracca* Wse. non Kraatz.
- » 542. *Cryptocephalus* var. *posticeinstitutus* Pic ad *imperialis* referendus.
- » 550. *Gastroidea viridula* Dej. muß den Namen führen *hypochacridis* L. (*Cryptocephalus*). *Cr. hypochaer.* auct. non L. = *cristula* Dufour.
- » 551. *Timarcha scabripennis* Fairm. Hi. m. ist Art; *scabra* Oliv. ist eine andere nordafrikanische Art.
- » 553. *Chrysomela Kut:netzovi* non *Kat:etzovi*.
- » 561. Bei *Phytodecta nigrosa* Suffr. fehlen die in Ent. Nachr. 1882 aus Tirol von Gradl beschriebenen a. *8-punctata* und a. *nana* p. 330. a. *nigricollis*, a. *tirolensis*, a. *elythroides* und a. *marginata* p. 331.
- Die *Phytodecta*-Namen müssen weibliche Endungen haben, ebenso *Phyllodecta*.
- » 584. *Cassida inuadata*, *aurora* und *Panzeri* ist D. 1906 zu streichen und W. 1907, 14 zu setzen.
- » 594. **Otiorrhynchus salicis** Stierl. kollidiert mit *salicis* Ström (p. 603). Ich benenne die Stierlinsche Art **salicicola** Heyd.
- » 600. *Ot. (Dorymerus) nicacensis* Strl. = *Meira nicacensis* Strl.
- » 609. *Peritelus Reitteri* Vitale ad subgen. *Pseudomeira*.
- » 615. *Nadhernus macrops* Reitt. soll nicht von den Seealpen, sondern aus Madagascar, nach Mittheilung von Holdhaus an Flach, stammen und von Sikora gesammelt sein. Verwechslung der Fanggläser.
- » 616. *Eudipnus asturicensis* Chev. (*brevipennis* Kirsch, orig. coll. Heyden) hier zu streichen. Steht p. 624 richtig bei *Homapterus*.
- » 625. *Sitona* ist weiblich, also *gressoria* etc. Fehler übernommen aus früheren Catalogen, als man die Gattung *Sitones* nannte.
- » 631. *Liophloeus v. hungaricus* Tourn. (orig. unie. coll. Heyden) = *Barynotus obscurus* var.

- p. 631. *Barynotus elevatus* Marsh. (*moerens* auct. non. F.) Die Fabricius-Art = *Sitona*.
- » 636. *Chromonotus hirsutulus* non *hirsutus*.
- » 642. *Lirus Lauferi* Petri (*lateralis* Bris. non Panz.) p. 641.
- » 647. *Gronops adde luctuosus* Chev. Rev. zool. 1861, 120. (Algier Hi.: Calatrava. — Heyd. Span. 206. *Dichotrachelus*. Die angegebenen Synonyme von *sulcipennis* sind Arten.
- » 659. *Eriirrhinus globicollis* Fairm. 1863 = *Echinoenemus pugnar* Faust (1881) = *confusus* Faust (1883).
- » 661. *Smicronyx Lallemanti* Faust = var. *opacus* Bris.
- » 665. *Mesites cunipes* non *curvipes*.
- » 671. *Rhinocerus* fehlt *gramineus* F. Ent. Sys. I. 1792. 465. Rtrr. 211, E., *inconspicuous* auct. non Hbst.
- p. 671. *Eubrychius*. — Beck benannte seine Art *velutus* (non *relatus*) von velum, Segel, weil er auf dem Wasser mit Luftblase schwimmt.
- » 673. *Ceutorrhynchus effrons* streichen, siehe p. 676.
- » 678. *Ceutorrhynchus fossarum* Reich = *Miarus campanulae* L. *C. albofasciatus* Goeze = *Analus haemorrhous* Hbst.
- » 682. *Balanobius troglodytes* Jekel streichen. Anatolia.
- » 689. *Isochnus Sequensi* 1894 non 1893.
- » 692. *Eutenuoscelis* non *Ertenuoscelis*.
- » 714. *Lucanus cervus* L. v. *Pontbrianti* Muls. Lyon.
- » 715. *Trox nivicola* Bonnaire Ga. = *Perrisi* Fm. Algier. *Haroldi* Flach ist Art.
- » 716 etc. Bei den *Coprophagi* fehlen die vielen Abberationen Mulsants in Col. France Lamellicornes ed. I, 1842. Es würde zu weit führen, sie alle zu nennen. In seiner edit. II, 1871 hat er sie meist weggelassen.
- » 725. *Ceratophyus Olivieri* 1865 non 1864.
- » 726. *Trypocopriss Amedei* aus Anatolien streichen.
- » 727. *Lethrus Heydeni* Fm. 1866 ganz ungenügend beschrieben = *Raymoudi* Reitt., der, obgleich später (1890) beschrieben, zu gelten hat.
- » 730. *Glaphyrus serratulae* F. et var. sind zu streichen, da sie nicht auf spanischem Gebiet, sondern nur in Algier und Marocco vorkommen.
- » 731. *Anthypna Laportei* non *Lapontei*.
- » 734. *Rhinotrogus forcatus* non *forcolatus*.

- p. 736. *Rhiz. trisinnatus* Rtrtr. Lu: Sr. Estrella non Hi. m. orig. unic. in coll. Heyden.
- » 737. *Melolontha papposa* a. **rufolestacea** non *testacea*.
- » 745. Bei den *Trichius*-Aberrationen ist als Autor zu setzen: de Rossi in Neviges in Westfalen und nicht der bekannte Italiener Rossi des 18. Jahrhunderts.
- » 748. *Potosia affinis* zufügen: v. *alboulata* Comte A'. 1906, 249, Ga. Roman.
- » 749. *Potosia angustata* zufügen: a. *azurca* König W. 1901, 10. Ca.
- » 752. *Arpedium Schatzmayri* non *Schatzmayeri*.

Bemerkungen über die Bestimmungs-Tabelle 60 Curculionidae: *Larinus*, bearbeitet von Dr. K. Petri 1907.

Von Professor Dr. L. von Heyden in Bockenheim.

In Ann. Soc. Ent. France 1874 veröffentlichte Leprieur das nachgelassene Manuskript von Capiomont (gest. 15. Nov. 1871) über *Larinus* und verwandte Gattungen. Wenn auch Capiomonts Arbeit unvollendet ist, so gibt sein Tableau synoptique und seine Beschreibung der Arten doch eine genügende Übersicht über den damaligen Stand unserer Kenntnis dieser schwierigen Gattungen und waren bis heute das Gerippe, an das sich alle Neubeschreibungen anschlossen.

Capiomont hat auch mein ganzes Material vorgelegen, war aber nach dessen Tod fast zwanzig Jahre verschwunden, bis es Freund Bedel durch Zufall im Pariser Museum unter den Vorräten wieder auffand und so sind eine ganze Reihe Typen, zum Teil unica, gerettet.

Dr. Petri hat es nun in dankenswerter Weise unternommen, die Gattung *Larinus* in Reiters Tabelle Nr. 60 neu zu bearbeiten; auch ihm lag mein ganzes Sammlungsmaterial vor.

Nachstehend gebe ich, ohne mich kritisch über die mühevollen Arbeit zu äußern, eine Reihe von Bemerkungen wie sie mir beim Neueinordnen in die Sammlung an der Hand dieser Tabelle auffielen.